

●末梢から投与可能な輸液製剤

2017.12作成
2018.07改訂

<カロリー 多い順>

	カロリー (Kcal)	NaCl (g)	K	Ca	pH	備考
トリフリード輸液500mL	210	0.73	20mEq/L (K2HPO4として0.87g)	5mEq/L	5.0	腎障害・肝障害禁忌
リナセートD輸液500mL	100	3.00	4mEq/L (KClとして0.15g)	3mEq/L	4.0~6.0	
ソリターT3号輸液 500mL	86	0.45	20mEq/L (KClとして0.745g)	なし	3.5~6.5	
ソリターT1号輸液 500mL	52	2.07	なし	なし	3.5~6.5	
ソリターT3号輸液 200mL	34	0.18	20mEq/L (KClとして0.298g)	なし	3.5~6.5	
ソリターT1号輸液 200mL	21	0.83	なし	なし	3.5~6.5	
ピカーボン輸液500mL	なし	3.07	4mEq/L (KClとして0.15g)	3mEq/L	6.8~7.8	甲状腺機能低下症禁忌

※パレプラス輸液500mL カロリー (Kcal) 210 NaCl (g) 0.25 ・ ・ ・ アミノ酸含有するため腎障害・肝障害禁忌

<塩化ナトリウム 多い順>

	カロリー (Kcal)	NaCl (g)	K	Ca	pH	備考
ピカーボン輸液500mL	なし	3.07	4mEq/L (KClとして0.15g)	3mEq/L	6.8~7.8	甲状腺機能低下症禁忌
リナセートD輸液500mL	100	3.00	4mEq/L (KClとして0.15g)	3mEq/L	4.0~6.0	
ソリターT1号輸液 500mL	52	2.07	なし	なし	3.5~6.5	
ソリターT1号輸液 200mL	21	0.83	なし	なし	3.5~6.5	
トリフリード輸液500mL	210	0.73	20mEq/L (K2HPO4として0.87g)	5mEq/L	5.0	腎障害・肝障害禁忌
ソリターT3号輸液 500mL	86	0.45	20mEq/L (KClとして0.745g)	なし	3.5~6.5	
ソリターT3号輸液 200mL	34	0.18	20mEq/L (KClとして0.298g)	なし	3.5~6.5	

※グリセオール注300mL NaCl (g) 2.7 ・ ・ ・ NaCl含有するため注意！！

<カリウム 多い順>

	カロリー (Kcal)	NaCl (g)	K	Ca	pH	備考
トリフリード輸液500mL	210	0.73	20mEq/L (K2HPO4として0.87g)	5mEq/L	5.0	腎障害・肝障害禁忌
ソリターT3号輸液 500mL	86	0.45	20mEq/L (KClとして0.745g)	なし	3.5~6.5	
ソリターT3号輸液 200mL	34	0.18	20mEq/L (KClとして0.298g)	なし	3.5~6.5	
ピカーボン輸液500mL	なし	3.07	4mEq/L (KClとして0.15g)	3mEq/L	6.8~7.8	甲状腺機能低下症禁忌
リナセートD輸液500mL	100	3.00	4mEq/L (KClとして0.15g)	3mEq/L	4.0~6.0	
ソリターT1号輸液 500mL	52	2.07	なし	なし	3.5~6.5	
ソリターT1号輸液 200mL	21	0.83	なし	なし	3.5~6.5	

<酸性度 強い (pH低い) 順>

	カロリー (Kcal)	NaCl (g)	K	Ca	pH	備考
ソリターT3号輸液 500mL	86	0.45	20mEq/L (KClとして0.745g)	なし	3.5~6.5	
ソリターT3号輸液 200mL	34	0.18	20mEq/L (KClとして0.298g)	なし	3.5~6.5	
ソリターT1号輸液 500mL	52	2.07	なし	なし	3.5~6.5	
ソリターT1号輸液 200mL	21	0.83	なし	なし	3.5~6.5	
リナセートD輸液500mL	100	3.00	4mEq/L (KClとして0.15g)	3mEq/L	4.0~6.0	
トリフリード輸液500mL	210	0.73	20mEq/L (K2HPO4として0.87g)	5mEq/L	5.0	腎障害・肝障害禁忌
ピカーボン輸液500mL	なし	3.07	4mEq/L (KClとして0.15g)	3mEq/L	6.8~7.8	甲状腺機能低下症禁忌