

岐阜民医連 約束処方一覧 (外用)

2014.08改訂

搔痒 レメプラ 50	
1-メントール	1.25
レスタミンコーワクリーム	25
プラスチックベース	25

口内炎 ヘルペス液 7	
デカドロン錠0.5mg	1.0
キシロカインビスカス2%	2
グリセリン液	2.5
精製水	2.5

年齢	~2	3~5	6~
発作時	Vb1	Vb2	Vb3
ベネトリン吸入液0.5%	0.15	0.2	0.3
ブロムヘキシシ吸入0.2%	0.35	0.5	0.7
生理食塩液	0.5	0.7	1.0
全量	1.0	1.4	2.0

保湿 プロベトベース (プブ) 50	
プラスチックベース	47.5
プロベト	2.5

口唇のあれ グリセリン50% 20	
グリセリン液	10
精製水	10

予防	VI1	VI2	VI3
ベネトリン吸入液0.5%	0.15	0.2	0.3
インタール吸入液1%	1A	1A	1A

帯状疱疹 ボチカイン (アアミ) 20	
亜鉛華軟膏	10
アミノ安息香参エチル軟膏	10

超ネブ用吸入液		
U-Vb3	10	500
ベネトリン吸入液0.5%	0.2	10
ブロムヘキシシ吸入0.2%	1.8	90
生理食塩液	8.0	400

発作時	Va1	Va2	Va3
ベネトリン吸入液0.5%	0.15	0.2	0.3
アレバール吸入0.125%	0.85	1.2	1.7
全量	1.0	1.4	2.0

鼻閉 プリビナ小児用 3	
プリビナ液0.05%	1
精製水	2

超ネブ用吸入液		
U-Va3 10ml	10	500
ベネトリン吸入液0.5%	0.2	10
アレバール吸入0.125%	1.8	90
生理食塩液	8.0	400

発作時	DS1	DS2
	15kg未満	15Kg以上
デカドロン注射液1.65mg	0.2	0.3
ボスミン注1mg	0.5	1
生理食塩液	1.3	0.7
全量	2	2

HS-E 20ml 高張Na-Epinephrine液	
10%NaCl注射液	8.0
ボスミン注1ml	1A
注射用蒸留水	11.0

ネブライザー用吸入液		
Vb3	2	100
ベネトリン吸入液0.5%	0.3	15
ブロムヘキシシ吸入0.2%	0.7	35
生理食塩液	1.0	50

メプチン吸入液 ユニット0.3ml	1滴	3滴	4滴	1本
	0.05	0.15	0.2	0.3

胃粘膜染色液 100mL	
インジゴカルシ 0.15	0.15
精製水	適
全量	100

ネブライザー用吸入液		
Va3	2	100
ベネトリン吸入液0.5%	0.3	15
アレバール吸入0.125%	1.7	85

食道粘膜染色液3%ルゴール液100mL	
ヨウ素	3
ヨウ化カリウム	6
精製水	適量