

岐阜民医連 約束処方一覧 (内服)

2015.04改訂

熱・咳・痰	
ヒスノン600 (コメブ)分3/分3	
ブルフェン200	3T
メジコン15	6T
アンブロキシソール15	3T
レバミピド100	3T

喘鳴	
TM (コムN) 4.0/分3	
コンボン細粒1%	1.0
ムコダインDS50%	3.0

下痢	
BT (ミタ) 6/分3	
タンニン酸アルブミン	3.0
ビオスリー配合散	3.0

熱・咳・痰	
ヒスノン300 (コメブ)/分3	
ブルフェン100	3T
メジコン15	3T
アンブロキシソール15	3T
レバミピド100	3T

咳・痰	
MA錠6 /分3	
メジコン15	6T
アンブロキシソール15	3T

炎症・疼痛	
LM /分3	
ロキソプロフェンNa錠	3T
レバミピド100	3T

咳 妊可・乳注 小児中止	
プロコデS(オセ)25mL/分3	
オピセゾールコデイン	6.0
セネガシロップ	19.0

咳・痰	
MA錠3 /分3	
メジコン15	3T
アンブロキシソール15	3T

掻痒	
U散 (テワ) 3/分3	
テルギンGDS0.1%	2.0
ワッサーV配合顆粒	1.0

咳込 寝る前 小児中止	
セキP (アリ)1.5/分1	
アタラックスP 10%	0.5
リン酸ジヒコデ散1%	1.0

咳・痰	
MA 散(アム) 4/分3	
アスベリン散10%	1.0
小児用ムコソルバンDS1.5%	3.0

熱・咳・痰・鼻⇒ヒスノン+(オロパタジン錠5mg or ゼスラン錠3mg or ベネン錠1mg)

咳・痰・鼻⇒ MA錠 +(オロパタジン錠5mg or ゼスラン錠3mg or ベネン錠1mg)

※ゼスラン錠3mg、ベネン錠1mgは安価希望者のみ

嚥下困難者の咳・痰・鼻

PWR(メペム)⇒ MA散 + テルギンGDS0.1%

FH (アポメ) ⇒ PL配合顆粒 + アスベリン散10%