

パーキンソン治療薬一覧① ○採用薬  
 △限定採用 ▲はパーキンソンには使用しない ◆禁忌  
 ■は新薬2012年以降

分類	一般名	商品名	剤型	規格	薬価	1日薬価	1日当たりの 服用回数	採用	代謝		粉 砕	簡 易 懸 濁	一 包 化	特徴
									肝	腎				
レボドパ単剤	レボドパ	ドパストン	静注	25mg 10mL	153	306	1~2	○						●効果の発現は非常に早い ●運動合併症が出現しやすいため 現在はレボドパ単剤の使用はほとんどない
			静注	50mg 20mL	281	281	1~2							
			カプセル	250mg	23	319	1~3			○	—	○		
			散	98.5%	66	233	1~3				—	×		
		ドパゾール	錠	200mg	19	346	1~3	▲			△	—	○	●認知症患者、高齢者での開始薬
レボドパ+DCI合剤	レボドパ・カルビドパ (10:1)	メネシット <small>※レボドパとして</small>	配合錠	100mg <sup>※</sup>	36	271	3	○			△	○	○	
			配合錠	250mg <sup>※</sup>	91	272	3			△	○	○		
	ネオドパストン	配合錠L	100mg <sup>※</sup>	36	271	3			○	○	○			
		配合錠L	250mg <sup>※</sup>	91	272	3			○	○	○			
	レボドパ・ベンセラシド (4:1)	マドパー	配合錠	100mg <sup>※</sup>	33	196	1~3			×	○	△		
			イーシー・ドパール	配合錠	100mg <sup>※</sup>	33	196	1~3	△		△	○	○	
		ネオドパゾール	配合錠	100mg <sup>※</sup>	37	222	1~3			×	○	○		
MAO-B 阻害薬	セレギリン塩酸塩	エフピー	OD錠	2.5mg	326	977	2	○			○	○	○	●レボドパ含有製剤との併用 ●wearing off現象を改善
COMT 阻害薬	エンタカポン	コムタン	錠	100mg	211	3381	8回まで	○			○	○	○	●レボドパ+DCI合剤との併用 ●wearing off現象を改善

# パーキンソン治療薬一覧②

○ 採用薬

△ 限定採用 ▲はパーキンソンには使用しない ◆ 禁忌

は新薬2012年以降

分類	一般名	商品名	剤型	規格	薬価	1日薬価	1日当たりの服用回数	採用	代謝		粉砕	簡易懸濁	一包化	特徴
									肝	腎				
〈麦角系〉	ブロモクリプチン メシル酸塩	パーロデル	錠	2.5mg	115	1037	3				△	△	○	●ドパミンアゴニストはレボドパと比べて運動症状の改善はやや劣るが、運動症状の日内変動の予防については優れている
	ペルゴリド メシル酸塩	ペルマックス	錠	50μg	53	1315	3				×	○	△	
			錠	250μg	219	1095	3	▲			×	○	△	
	カベルゴリン	カバザール	錠	0.25mg	85	1019	1				△	○	○	
錠			1.0mg	286	858	1				△	○	○		
〈非麦角系〉	タリペキソール塩酸塩	ドミン	錠	0.4mg	151	1359	3				○	○	○	●麦角系は心臓弁膜症の副作用あり⇒非麦角系で効果不十分、忍容性に問題がある場合のみ使用  ●非麦角系は突発的睡眠、傾眠の副作用あり  ●パーロデル、カバザールは乳汁漏出症、高プロラクチン血症に適応  ●ビ・シフロール、ニュープロはレストレスレッグ症候群に適応  ●アポカインはオフ症状の改善にのみ適応
	プラミペキソール 塩酸塩	ビ・シフロール	錠	0.125mg	54	1951	3	○			△	○	△	
			錠	0.5mg	186	1674	3	△			△	○	△	
		ミラベックス	LA錠	0.375mg	151	1814	1	△	◆	×	×	△		
	LA錠		1.5mg	519	1557	1	△	◆	×	×	△			
	ロピニロール塩酸塩	レキップ	錠	0.25mg	57	2045	3				○	○	○	
			錠	1mg	197	1769	3	△			○	○	○	
			錠	2mg	365	1641	3				○	○	○	
			CR錠	2mg	274	1231	1	○			×	×	○	
			CR錠	8mg	941	1059	1	○			×	×	○	
	ロチゴチン	ニュープロ	パッチ	2.25mg	270	4325	1							
			パッチ	4.5mg	417	3332	1							
			パッチ	9mg	642	2567	1							
			パッチ	13.5mg	827	2232	1							
アポモルヒネ 塩酸塩水和物	アポカイン	皮下注	30mg 3mL	7550	15100		オフ症状の発現時	◆						

パーキンソン治療薬一覧③ ○ 採用薬  
 △ 限定採用 ▲ はパーキンソンには使用しない ◆ 禁忌  
 ■ は新薬2012年以降

分類	一般名	商品名	剤型	規格	薬価	1日薬価	1日当たりの 服用回数	採用	代謝		粉砕	簡易懸濁	一包化	特徴
									肝	腎				
抗コリン薬	トリヘキシフェニジル 塩酸塩	アーテン	散	1%	20	20	3~4				○	○	●振戦に有効 ●認知症のある患者および高齢者には使用を控えるべき	
			錠	2mg	9	43	3~4	▲			△	○		
		トレミン	散	1%	17	17	3~4				×	○		
			錠	2mg	9	43	3~4				△	×		
	ピペリデン	アキネトン	錠	1mg	6	34	2	○			○	○		○
			細粒	1%	30	18	2				×	○		
注射液			5mg 1mL	58	116		○							
ノルアドレナリン 前駆物質	ドロキシドパ	ドプス	細粒	20%	138	415	3				—	×	●すくみ足、立ちくらみに有効 ●血液透析患者の起立性低血圧に適応	
			OD錠	100mg	74	445	3				○	○		○
			OD錠	200mg	137	411	3	○			○	○		○
			カプセル	100mg	74	445	3				△	○		○
			カプセル	200mg	137	411	3				△	—		○
ドパミン 遊離促進薬	アマンタジン塩酸塩	シンメレル	細粒	10%	58	115	2			◆		○	△	●ジスキネジア抑制に有効
			錠	50mg	30	120	2	○		◆	△	○	○	
			錠	100mg	58	116	2			◆	△	○	○	
レボドパ 賦活薬	ゾニサミド	トレリーフ	錠	25mg	1085	1085	1	△			○	○	○	●レボドパ含有製剤との併用口 ●wearing off現象を改善 ●エクセグランと同一成分
A2A受容体拮抗薬 アデノシン	イストラデフィリン	ノウリアスト	錠	20mg	761	761	1		◆		○	○	○	●レボドパ含有製剤との併用口 ●wearing off現象を改善